

VALORACION DERMATITIS DEL PAÑAL POR HUMEDAD (DPH)

Palomar-Llatas, F., Fornes-Pujalte, B., Sierra-Talamantes, C., Landete-Belda, L., Diez-Fornés, P., Castellano-Rioja, E., Fernández-García, D., Bonías-López, J., Moreno-Hernández, A., Murillo-Escutia, A., Seller-Arias, M. **ENFERMERÍAdermatológica** • No 20 • septiembre-diciembre 2013

PUNTOS	SEVERIDAD DE LA LESION	GRADO AFECTACION
1	LIQUENIFICACIÓN: Epidermis engrosada	LEVE ++
2	ERITEMA + EDEMA: Inflamación epidérmica. Dolor	LEVE +++
3	DESCAMACIÓN ECZEMA: Epidermis seca. Prurito	MODERADO
4	ERITEMA IRRITATIVO + HUMEDAD: Afectación epidermis superficial/vesículas. Dolor, prurito	MODERADO +
5	CANDIDIASIS/IMPETIGO: Afectación completa de la epidermis.	ALTO
6	ULCERA: Afectación dermis profunda	MUY ALTO

VALORACION DERMATITIS DEL PAÑAL POR HUMEDAD (DPH)

Palomar-Llatas, F., Fornes-Pujalte, B., Sierra-Talamantes, C., Landete-Belda, L., Díez-Fornés, P., Castellano-Rioja, E., Fernández-García, D., Bonías-López, J., Moreno-Hernández, A., Murillo-Escutia, A., Seller-Arias, M. **ENFERMERÍAdermatológica** • No 20 • septiembre-diciembre 2013

VALORACION DERMATITIS DEL PAÑAL POR HUMEDAD (DPH)



PROTOCOLO DERMATITIS POR HUMEDAD (DPH)

LESION	GRADO AFECTACION	TRATAMIENTO TOPICO + DISPOSITIVO ABSORVENTE
1 LIQUENIFICACIÓN	LEVE	Ácidos Grasos hiperoxigenados o lociones hidratantes. Barrera de Co/terpolimero de acrilato + HMDS
2 ERITEMA + EDEMA	LEVE +	Barrera de Co/terpolimero de acrilato + HMDS Pasta de oxido de zinc.
3 DESCAMACION + ECZEMA	MODERADO	Pasta de oxido de zinc + crema de hidrocortisona 1%
4 ERITEMA EXUDATIVO	MODERADO +	Fomentos astringentes (Agua sulfatada 1o%) + Pasta de oxido de zinc.
5 CANDIDIASIS	ALTO	Fomentos astringentes (Permanganato potásico 1/10.000 y cremas antimicóticas.
6 ULCERA	MUY ALTO	Apósitos de cura en ambiente húmedo en función del nivel de afectación, características de la lesión y nivel de exudados (alginato cálcico), cremas de oxido de zinc y control de exudados.